

Karta pacjenta

Rivertaxo	10 mg	☐
Rivertaxo	15 mg	☐
Rivertaxo	20 mg	☐

- Kartę należy mieć zawsze przy sobie
- Kartę należy pokazywać przed leczeniem każdemu lekarzowi lub dentyście

Jestem poddawany(-a) leczeniu przeciwzakrzepowym lekiem Rivertaxo (rywaroksaban).

Imię i nazwisko: _____

Adres: _____

Data urodzenia: _____

Masa ciała: _____

Grupa krwi: _____

Inne leki/choroby: _____

W nagłym przypadku należy powiadomić:

Pieczętka lekarza: _____

Imię i nazwisko lekarza: _____

Telefon lekarza: _____

Należy również powiadomić:

Telefon: _____

Imię i nazwisko: _____

Pokrewieństwo: _____

Informacja dla lekarza

Wskaźnik INR nie jest właściwy do pomiaru aktywności przeciwzakrzepowej leku Rivertaxo i z tego powodu INR nie może służyć do monitorowania leczenia Rivertaxo.

Co należy wiedzieć o leku Rivertaxo?

- Lek Rivertaxo rozrzedza krew, dzięki czemu zapobiega powstawaniu niebezpiecznych zakrzepów krwi.
- Lek Rivertaxo należy przyjmować dokładnie tak, jak zalecił to lekarz. W celu zapewnienia najlepszej ochrony przed powstaniem zakrzepów krwi, nigdy nie należy pomijać dawki.
- Nie wolno przerywać przyjmowania leku Rivertaxo bez uprzedniej konsultacji z lekarzem, ponieważ ryzyko powstania zakrzepów krwi może się zwiększyć.
- Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Rivertaxo należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
- Przed każdą operacją lub zabiegiem inwazyjnym, pacjent powinien poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Rivertaxo.

Kiedy należy zasięgnąć porady lekarza?

Podczas przyjmowania leków rozrzedzających krew, takich jak Rivertaxo, ważne jest, aby być świadomym możliwych działań niepożądanych. Krwawienie jest najczęstszym działaniem niepożądanym. Nie rozpoczynać przyjmowania leku Rivertaxo bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem, jeśli pacjent wie, że jest w grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia krwawienia.

Należy niezwłocznie powiadomić lekarza, jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy przedmiotowe lub podmiotowe krwawienia, takie jak:

- ból,
- obrzęk lub dyskomfort,
- ból głowy, zawroty głowy lub osłabienie,
- nadmierna skłonność do powstawania siniaków, krwawienia z nosa, krwawienia z dziąseł oraz ze skaleczeń, które nie ustają przez długi czas,

- krwawienie miesiączkowe lub krwawienie z pochwy o większym nasileniu niż normalnie,
- krew w moczu, która może dać różowe lub brązowe zabarwienie moczu, czerwone lub czarne zabarwienie stolca,
- odkrztuszanie krwi lub wymiotowanie krwią bądź treścią przypominającą fusy z kawy.

Jak przyjmować lek Rivertaxo?

W celu zapewnienia optymalnej ochrony lek Rivertaxo:

- 10 mg można przyjmować z posiłkiem lub bez,
- 15 mg należy przyjmować z posiłkiem,
- 20 mg należy przyjmować z posiłkiem.