

360 mm

Acidum salicylicum + Acidum (S)-lacticum

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu leku acerin brodawki na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

3. Jak stosować lek acerin brodawki

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek acerin brodawki jest przeznaczony wyłącznie do miejscowego stosowania na brodawki zlokalizowane na skórze.

Zalecana dawka

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat

Lek należy stosować 1 lub 2 razy na dobę na czystą i suchą skórę. Smarować wyłącznie powierzchnię brodawki, w zależności od wyników leczenia przez kilkanaście dni, maksymalnie od 4 do 8 tygodni.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie u dzieci

Lek acerin brodawki może być stosowany u dzieci w wieku od 2 do 12 lat, po konsultacji i pod kontrolą lekarza.

Lek nie jest wskazany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Sposób stosowania

Lek należy nałożyć pędzelkiem na czystą i suchą powierzchnię brodawki. Należy uważać, aby płyn nie dostał się na zdrową skórę, błony śluzowe lub do oczu. Poczekać, aż lek dobrze wyschnie. Przed ponowną aplikacją leku należy dokładnie umyć powierzchnię brodawki, usuwając powłokę pozostałą po poprzedniej aplikacji poprzez jej starcie.

Należy zwrócić uwagę, aby po każdym użyciu szczelnie zakręcać butelkę. Lek należy stosować ostrożnie, aby nie dopuścić do rozlania lub kapania płynu z pędzelka.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku acerin brodawki

Brak danych o przedawkowaniu leku w przypadku stosowania zgodnie ze wskazaniami i zalecanym sposobem stosowania. W razie przypadkowego spożycia leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku acerin brodawki

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić objawy podrażnienia i stan zapalny.

Zastosowanie leku na zdrową skórę może spowodować oparzenie i ból.

W razie wystąpienia niepokojących objawów należy zaprzestać stosowania leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Fax: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: <https://smz.ezdrowie.gov.pl>

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek acerin brodawki

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym pudełku i etykiecie butelki. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w suchym pomieszczeniu.

Przechowywać opakowanie szczelnie zamknięte. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Lek jest łatwopalny. Ostrożnie z ogniem. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek acerin brodawki

- Substancjami czynnymi leku są kwas salicylowy i kwas (S)-mlekowy. 1 g płynu na skórę zawiera 195 mg kwasu salicylowego i 98 mg kwasu (S)-mlekowego.
- Pozostałe składniki to: celulozy octanoftalan, kalafonia, aceton, octan n-butyłu.

Jak wygląda lek acerin brodawki

i co zawiera opakowanie

Lek acerin brodawki jest w postaci płynu na skórę.

Opakowanie leku to butelka z bezbarwnego szkła z polipropylenową zakrętką, zaopatrzoną w aplikator z pędzelkiem, w tekturowym pudełku. Opakowanie zawiera 8 g płynu na skórę.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Aflorarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice
Tel. + 48 42 22-53-100

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 07.2026